

.....

# Trulance®

(plecanatide)

Para adultos que padecen de estreñimiento idiopático crónico (CIC) o síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E)

## ALCANCE OTRO NIVEL DE ALIVIO



Trulance puede ayudarlo a tener deposiciones **MÁS** regulares y bien formadas, a sentir **MENOS** dolor abdominal relacionado con el SII-E y a tener una **BAJA** incidencia de diarrea.\*

\* En un ensayo clínico frente al uso de un placebo.

### ¿Qué es Trulance?

Trulance® (plecanatida) en comprimidos de 3 mg es un medicamento de venta con receta para adultos a fin de tratar el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E) y el estreñimiento idiopático crónico (CIC).

“Crónico” se refiere a que el estreñimiento es permanente. “Idiopático” se refiere a que se desconoce la causa del estreñimiento. **No se conoce si Trulance es eficaz en niños menores de 18 años de edad.**

### ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre Trulance?

- No les dé Trulance a niños menores de 6 años. Podría ser perjudicial para ellos.
- No debe dar Trulance a niños entre 6 y 18 años. Podría ser perjudicial para ellos.
- No tome Trulance si un médico le ha dicho que tiene una obstrucción intestinal (oclusión intestinal).

Consulte la información de seguridad importante adicional en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la [Información de prescripción completa y el prospecto.](#)

# ¿Qué es el estreñimiento?

No está solo. El estreñimiento es una afección que probablemente todos hayan experimentado en algún momento u otro. Existen dos tipos comunes de estreñimiento: el estreñimiento idiopático crónico (CIC) y el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E).



# Síntomas del estreñimiento

Los síntomas del estreñimiento pueden incluir deposiciones poco frecuentes o difíciles de evacuar, hinchazón, esfuerzo, molestias y sensación de no sentirse nunca realmente vacío. Si bien el CIC y el SII-E comparten muchos de estos mismos síntomas, existen diferencias importantes entre ambos.

## CIC

Una afección que provoca en los pacientes los síntomas enumerados anteriormente durante períodos prolongados sin una causa conocida.

“Crónico” se refiere a que el estreñimiento es permanente o reaparece. “Idiopático” se refiere a que se desconoce la causa del estreñimiento.



**1 de cada 7** adultos estadounidenses padece de CIC

## SII-E

Además de los síntomas de estreñimiento crónico, los pacientes con SII-E también sufren de dolor abdominal.



**1 de cada 20** adultos padece de SII-E



# La importancia de la forma de las heces

La escala de heces de Bristol es una representación visual de los 7 tipos diferentes de deposiciones que puede tener. Una deposición de tipo 4, descrita por la escala como una salchicha lisa, blanda o con forma de serpiente, no tiene bultos ni exceso de líquido y se considera bien formada. Por lo general, una de tipo 1 o 2 se considera estreñimiento, mientras que una de tipo 6 o 7, se suele considerar diarrea.

## ESCALA DE HECES DE BRISTOL

### Tipo 1

Bultos duros separados, como nueces (difíciles de evacuar).



### Tipo 2

Forma de salchicha, pero con bultos.



### Tipo 3

Como una salchicha, pero con grietas en la superficie.



### Tipo 4

Como una salchicha o serpiente, lisa y blanda.



### Tipo 5

Masas blandas con bordes bien definidos.



### Tipo 6

Pedazos esponjosos con bordes irregulares y consistencia pastosa.



### Tipo 7

Acuosa, sin partes sólidas (completamente líquida).



Adaptado de la escala de forma de heces de Lewis SJ, Heaton KW como una guía útil para el tiempo del tránsito intestinal. *Scand J Gastroenterol.* 1997;32:920-924.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA DE SEGURIDAD

### Antes de tomar Trulance, informe a su médico:

- Si tiene alguna otra afección médica.
- Si está embarazada o tiene previsto quedar embarazada. Se desconoce si Trulance puede tener algún efecto perjudicial en el feto.

Consulte la información de seguridad importante adicional en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la [Información de prescripción completa y el prospecto.](#)

## Hable con su proveedor de atención médica

Si bien puede parecer incómodo hablar sobre ello, decirle a su médico qué tipos de heces tiene normalmente puede ayudarlos a ambos a elaborar un plan de tratamiento que funcione para usted y su cuerpo.

### Para comenzar la conversación, informe a su médico lo siguiente:

#### 1. ¿Cuáles de estos síntomas de estreñimiento ha experimentado?

Menos de 3 deposiciones por semana	Esfuerzo
Deposiciones difíciles de evacuar	No sentirse vacío después de defecar
Dolor abdominal	Otros

---

#### 2. ¿Cuánto tiempo lleva tratando de controlar sus síntomas?

De 0 a 6 meses	De 2 a 4 años
De 6 a 12 meses	Más de 4 años
De 1 a 2 años	

#### 3. ¿Qué tipos de heces de la escala de heces de Bristol (a la izquierda) presenta con mayor frecuencia cuando no toma medicamentos?

Tipo 1	Tipo 5
Tipo 2	Tipo 6
Tipo 3	Tipo 7
Tipo 4	

### Luego, asegúrese de hacerse estas simples preguntas:

1. ¿Qué consistencia deben tener mis heces?
2. ¿Cuántas veces debo evacuar por semana?
3. ¿Podría Trulance ayudar a controlar mi estreñimiento?

---

¿Quiere una herramienta de debate más personalizada? Ingrese a [Trulance.com/DDG](https://Trulance.com/DDG) para crear su guía de debate médico personalizada.

---

# ¿Qué es Trulance®?

Si acaba de ser diagnosticado con CIC o SII-E, o lo ha padecido durante un tiempo, Trulance puede ayudarlo a tener deposiciones **MÁS** regulares y bien formadas en comparación con el grupo que tomó el placebo.



Para obtener más información,  
ingrese a [Trulance.com](https://www.Trulance.com).

•••••

# Trulance®

(plecanatide)

## Trulance puede ayudarlo a tener deposiciones **MÁS regulares y bien formadas.\***

\* En comparación con el grupo que tomó el placebo.

Trulance se probó en pacientes durante un período de investigación de 12 semanas.

Antes de ingresar al estudio:

- Los participantes tuvieron 2 deposiciones naturales (cualquier tipo de deposición) en una semana. Trulance ayudó a los pacientes a tener 5 deposiciones naturales en una semana.
- Los pacientes tuvieron alrededor de una deposición natural completa (sensación de evacuación completa) en 3 semanas. Trulance ayudó a las personas a tener 3 deposiciones completas en una semana.



## Trulance ayudó a las personas a tener deposiciones o formas de heces "normales" (salchicha blanda y lisa o en forma de serpiente).



**Trulance puede ayudar a aliviar su estreñimiento en tan solo 24 horas.\***

\* En estudios clínicos, se observaron los resultados sin usar laxantes.

En el caso de las personas que padecen de SII-E, Trulance ayudó a los pacientes a sentir **MENOS** dolor de estómago (abdominal).




## INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA DE SEGURIDAD

**Antes de tomar Trulance, informe a su médico (continuación):**

- Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si Trulance pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma Trulance.
- **Sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos de hierbas.

Consulte la información de seguridad importante adicional en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la [Información de prescripción completa y el prospecto.](#)

# ¿Cómo funciona Trulance y qué lo hace diferente?



Trulance está diseñado para actuar como la uroguanilina natural en su cuerpo y ayudar a proporcionar la cantidad adecuada de líquido en los intestinos.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA DE SEGURIDAD

### ¿Cuáles son los efectos secundarios frecuentes de Trulance?

La diarrea es el efecto secundario más frecuente y, a veces, puede ser intensa. La diarrea suele comenzar dentro de las primeras 4 semanas de tratamiento con Trulance. Si tiene diarrea intensa, deje de tomar Trulance y llame de inmediato a su médico.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Trulance. Informe a su médico si manifiesta algún efecto secundario que le moleste o no desaparezca.



Para obtener más información, ingrese a [Trulance.com](https://www.Trulance.com).

## **Trulance replica lo que el cuerpo puede hacer naturalmente\***

Trulance es el primer medicamento para tratar el CIC y el SII-E que está diseñado para funcionar como un péptido natural en su cuerpo llamado "uroguanilina". Para comprender mejor cómo funciona la uroganilina, observemos más de cerca lo que sucede en su cuerpo durante el proceso de digestión.

- **Después de comer, la comida se descompone en el estómago y los intestinos.**
- **Durante el proceso de digestión, el líquido ayuda a formar la consistencia de las heces.**
- **Cuando hay muy poco líquido, puede ocurrir el estreñimiento, mientras que demasiado líquido puede provocar la diarrea.**
- **La uroganilina se encuentra en el tubo gastrointestinal y funciona mejor en el intestino delgado, donde, según los niveles cambiantes de pH de esta zona, proporciona la cantidad adecuada de líquido para crear heces bien formadas.\***
- **Además, se ha demostrado que la uroganilina reduce el dolor abdominal.\***

\* Estos resultados se observaron en estudios con animales. La relevancia para los humanos aún se desconoce.

### **¿Cuál es la diferencia entre Trulance y la uroganilina?**

Trulance funciona de manera muy similar a la uroganilina que su cuerpo produce naturalmente, salvo un pequeño cambio en la molécula de Trulance que mejora la forma en que se adhiere al intestino delgado.

Al replicar la actividad de la uroganilina, Trulance también puede ayudar a proporcionar la cantidad adecuada de líquido para crear heces bien formadas y disminuir el dolor abdominal en pacientes que padecen de SII-E. Los beneficios y la seguridad de Trulance se han comprobado tanto para tratar el CIC como el SII-E.

**Consulte la información de seguridad importante adicional en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la [Información de prescripción completa y el prospecto.](#)**

# ¿Qué debo saber antes de tomar Trulance?

**Trulance es un medicamento para adultos con CIC o SII-E que se toma una vez por día.**



Once-daily tablet



Any time of day



With or without food

## ICD-10 codes\*

K58.1

Irritable bowel syndrome with constipation

K59.04

Chronic idiopathic constipation

- No contiene lactosa ni gluten.

## Sacar el mejor provecho de Trulance

Para obtener los mejores resultados, es importante tomar Trulance todos los días o según las indicaciones de su médico.

Recuerde que los resultados pueden variar y el alivio puede presentarse mucho antes en algunas personas que en otras.



Para obtener más información, ingrese a [Trulance.com](https://www.Trulance.com).

.....

# Trulance®

(plecanatide)

## Trulance se puede tomar a cualquier hora del día, con o sin alimentos.

No debería tener que planificar su día en torno a su medicamento. Trulance le permite planificar sus horarios gracias a una dosificación flexible.

### La seguridad de Trulance está comprobada.

Menos del 5 % de las personas tuvieron diarrea frente al 1 % que pertenece al grupo que tomó el placebo.

No es una receta válida, solo a modo ilustrativo.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre Trulance?

- No les dé Trulance a niños menores de 6 años. Podría ser perjudicial para ellos.
- No debe dar Trulance a niños entre 6 y 18 años. Podría ser perjudicial para ellos.
- No tome Trulance si un médico le ha dicho que tiene una obstrucción intestinal (oclusión intestinal).

Consulte la información de seguridad importante adicional en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la [Información de prescripción completa y el prospecto.](#)

## ¿Qué es Trulance?

Trulance® (plecanatida) en comprimidos de 3 mg es un medicamento de venta con receta para adultos a fin de tratar el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E) y el estreñimiento idiopático crónico (CIC). "Crónico" se refiere a que el estreñimiento es permanente. "Idiopático" se refiere a que se desconoce la causa del estreñimiento. **No se conoce si Trulance es eficaz en niños menores de 18 años de edad.**

## ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre Trulance?

- **No les dé Trulance a niños menores de 6 años. Podría ser perjudicial para ellos.**
- **No debe dar Trulance a niños entre 6 y 18 años. Podría ser perjudicial para ellos.**
- No tome Trulance si un médico le ha dicho que tiene una obstrucción intestinal (oclusión intestinal).

## Antes de tomar Trulance, informe a su médico:

- Si tiene alguna otra afección médica.
- Si está embarazada o tiene previsto quedar embarazada. Se desconoce si Trulance puede tener algún efecto perjudicial en el feto.
- Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si Trulance pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma Trulance.
- **Sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos de hierbas.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios frecuentes de Trulance?

**La diarrea es el efecto secundario más frecuente y, a veces, puede ser intensa. La diarrea suele comenzar dentro de las primeras 4 semanas de tratamiento con Trulance. Si tiene diarrea intensa, deje de tomar Trulance y llame de inmediato a su médico.**

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Trulance. Informe a su médico si manifiesta algún efecto secundario que le moleste o no desaparezca.

Le recomendamos informar los efectos secundarios a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088, o bien puede informar los efectos secundarios a Bausch Health al 1-877-361-2719.

**Consulte la información de seguridad importante adicional en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la [Información de prescripción completa y el prospecto.](#)**



**Para obtener más información,  
ingrese a [Trulance.com](http://Trulance.com).**

## Tarjeta de ahorro de Trulance

Los pacientes elegibles\* con seguros comerciales pueden pagar tan poco como **\$25 por un suministro de hasta 90 días** de Trulance.

Inscríbase en el programa de la **tarjeta de ahorro** ingresando a **Trulance.com/savings.**

¿Necesita ayuda para pagar su receta? **Llame al 888-869-8869** para verificar si es elegible para recibir asistencia financiera adicional.



Consulte la información de seguridad importante adicional en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la Información de prescripción completa y el prospecto.

\* Consulte los términos y condiciones en la contraportada.

.....  
**Trulance®**  
(plecanatide)



- Los pacientes elegibles\* con seguro comercial pueden tener un copago tan bajo como \$25 por un suministro de hasta 90 días.

## Pague tan poco como \$25\* por un suministro de hasta 90 días

Para ahorrar dinero en su compra de Trulance, simplemente haga lo siguiente:

1. Obtenga una receta para Trulance.
2. Obtenga una tarjeta de ahorro de Trulance en el consultorio de su médico o imprima una tarjeta en [Trulance.com/Savings](https://Trulance.com/Savings).
3. Siga las instrucciones en [Trulance.com/Savings](https://Trulance.com/Savings) para activar su tarjeta.

**\*† TÉRMINOS Y CONDICIONES:** El/la paciente no es elegible si es beneficiario/a de cualquier programa de atención médica federal o estatal con cobertura de medicamentos recetados, como Medicaid, Medicare, Medigap, VA, DOD, TRICARE o cualquier otro programa de salud federal o estatal (cada uno un "Programa del Gobierno") o donde esté prohibido por la ley, si pide un reembolso o presenta un reclamo para pedir un reembolso a alguno de esos programas. El paciente debe estar inscrito y pedir un reembolso, o presentar un reclamo para pedir un reembolso, en un plan de seguro comercial. La oferta excluye a los pacientes que pagan en efectivo. Para calificar para esta oferta, los gastos de bolsillo del paciente deben ser de un mínimo de \$25 por receta. Sujeto a topes máximos de descuento. El gasto máximo de bolsillo del paciente puede variar. El paciente debe ser mayor de 18 años y menor de 65 años para participar en el programa. Esta oferta es válida solo en los EE. UU. y Puerto Rico; no tiene valor donde la ley lo prohíba. Consulte los términos, condiciones y criterios de elegibilidad completos del programa en [Trulance.com](https://Trulance.com). La oferta es válida para hasta 12 reposiciones de medicamentos por año.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA DE SEGURIDAD

- **No les dé Trulance a niños menores de 6 años. Podría ser perjudicial para ellos.**
- **No debe dar Trulance a niños entre 6 y 18 años. Podría ser perjudicial para ellos.**
- No tome Trulance si un médico le ha dicho que tiene una obstrucción intestinal (oclusión intestinal).

**Consulte la información de seguridad importante adicional en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la [Información de prescripción completa y el prospecto.](#)**

**Salix**  
PHARMACEUTICALS

Trulance® es una marca registrada de Salix Pharmaceuticals.  
© 2020 Salix Pharmaceuticals o sus filiales.  
TRU.0120.USA.20 07/20